OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule **2** fr.)

72,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

DEUXIÈME FASCICULE

(10 Février 1912)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'ACADÉMIE
DIRECTEUR DE L'ÉCHANGE
CORRESPONDANT DU MUSEUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

SAINT-AMAND (CHER)

IMPRIMERIE BUSSIÈRE

70, RUE LAFAYETTE, 70

1912

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

AVANT-PROPOS

L'accueil fait à mon 1er fascicule m'ayant paru favorable auprès de ceux, peu nombreux encore, qui le connaissent (une publication nouvelle reste toujours en partie ignorée pendant un certain temps), je suis encouragé à en présenter ici même un deuxième.

Comme je l'avais prévu, le titre : « Mélanges Exotico-entomologiques) a provoqué quelques observations, on aurait notamment préféré le suivant : « Mélanges d'entomologie exotique », qui m'était un instant venu à l'esprit. Pourquoi ne l'ai-je pas choisi ? Une apostrophe ne m'a pas paru très à sa place au milieu d'une annotation bibliographique et j'ai renoncé à l'apostrophe au détriment de l'harmonie ; entre deux mots, j'ai choisi le moindre comme conséquence.

D'autre part, les titres : « Meletemata entomologica, Mélanges entomologiques », étant déjà publiés, je risquais, en adoptant un de ceux-ci, ou un autre analogue, de provoquer, sous prétexte d'une trop juste *préoccupation* scientifique, le changement futur de mon titre, d'où confusion vraisemblable et conséquence déplorable, au moins pour l'auteur.

Finalement, j'ai choisi un titre un peu dur dans son entier, mais qui n'a rien de choquant en abrégé, un titre que je juge à peu près (1) sûrement inédit. Mon titre excusé, et compris je l'espère, j'appelle l'attention particulière de nos collègues amateurs d'exotiques sur la présente publication, en sollicitant avec confiance toute leur aimable indulgence pour ce nouveau fascicule.

MAURICE PIC

15 janvier 1912

(1) Je dis à peu près, car, est-on jamais certain de ce que l'on sait en présence de tout ce que l'on peut ignorer.

DESCRIPTIONS D'ESPÈCES & VARIÉTÉS APPARTENANT A DIVERSES FAMILLES (1)

Mastax ochraceonotatum n. sp. Robuste, presque mat, pruineux, noir avec la base des antennes, les parties buccales et la majeure partie des pattes, ces dernières de coloration plus claire, testacés, élytres ornés d'une large fascie antérieure ocracée n'atteignant pas la suture et d'une macule discale postmédiane blanchâtre. Tête grande, inégale ; antennes robustes et longues ; prothorax un peu plus long que large en avant, en partie strigueux, ayant tous ses angles marqués et un sillon médian net ; élytres courts et larges, à épaules non prohéminentes, échancrés en arc large au sommet, marqués de faibles côtes ; pattes d'un testacé pâle avec les tarses, le sommet des cuisses, la base et le sommet des tibias foncés, tibias antérieurs fortement échancrés et épineux en dedans. Long. 4 mill. Annam : Phuc-Son.

Cette espèce se distingue de *histrio* F. par la forme plus élargie et la coloration toute autre. Je me suis permis de la décrire parce que notre regretté collègue Maindron, peu de temps avant sa mort, l'a vue et jugée nouvelle.

Ptinus unifasciatus n. sp. Allongé, assez étroit, brillant, noir à reflets métalliques, pubescent de gris avec quel-

(1) Toutes les espèces et variétés décrites dans ce fascicule font partie de ma collection.

ques longs poils dressés, élytres avec une fascie postmédiane transversale faite de poils blanchâtres, antennes, sauf sur la base, et pattes rousses, cuisses un peu rembrunies. Prothorax long, subglobuleux en avant, étranglé près de la base, à ponctuation pupilleuse écartée; écusson petit, pubescent de blanc; élytres plus larges que le prothorax, faiblement rétrécis aux deux extrémités, strié-ponctués avec les intervalles étroits, épaules peu marquées, la bande postérieure blanchâtre ornant les élytres est droite mais se prolonge étroitement en arrière sur la suture. Long. 2 mill. environ. Chili : Santiago (P. Germain).

Cette espèce, très distincte par sa forme relativement étroite jointe à sa coloration, peut prendre place près de *inhumeralis* Pic.

Ptilinus truncaticeps n. sp. ♀. Allongé, subparallèle, convexe, presque mat, finement, densément et subruguleusement ponctué, revêtu d'une fine pubescence grise, roux avec les antennes, partie des pattes et abdomen plus clairs, yeux noirs. Tête longue, subcarénée sur le front, tronquée en avant; antennes dentées à partir du 4e article; prothorax court, élargi et arrondi sur les côtés (vu de dessus), sans gibbosité discale nette; élytres un peu moins larges que le prothorax, longs, avec quelques traces de stries. Long. 6,5 mill. Afrique Australe : Salisbury.

Diffère de *pectinicornis* L. par la tête de forme particulière et le prothorax plus dilaté latéralement.

Dryophilus rufithorax n. sp. Un peu allongé, brillant, éparsement pubescent de gris, roussâtre foncé avec le dessous du corps et le milieu des élytres largement obscurcis. Avant corps fortement, densément et en partie ruguleusement ponctué; yeux noirs, très saillants; antennes à 3 derniers articles peu plus longs que les précédents avec les articles 2 et suivants allongés; prothorax subglobuleux, bien plus étroit que les élytres, ces derniers à stries ponctuées de points forts, relativement longs et étroits, foncés

avec les épaules et l'extrémité rousses. Long. 2,3 mill. Afrique Australe : Dunbrody.

Cette espèce, très distincte par sa ponctuation jointe à sa coloration, peut prendre place près de *pusillus* Gylh.

Discodon subannulicorne n. sp. Allongé, subparallèle, un peu brillant, pubescent de flave, testacé-rougeâtre avec les élytres plus pâles, antennes en majeure partie et tarses plus ou moins foncés. Tête grosse, yeux noirs ; antennes noires avec le premier article testacé et une partie des articles subannelés de testacé au sommet ; prothorax transversal, incisé vers le milieu des côtés ♀, moins court et à incision précédée d'une dent émoussée peu saillante ♂ ; élytres un peu plus larges que le prothorax, sinués latéralement, en partie subruguleusement ponctués. Long. 9 mill. République Argentine (Wagner) (1).

Voisin par la coloration de *Baeri* Pic, en diffère par la tête entièrement testacée, la coloration des antennes et l'aspect moins brillant des élytres.

Oontelus reticulatus v. nov. testaceiceps. Tête testacée avec seulement une vague macule brunâtre sur le vertex, élytres d'un noir gris, pour le reste comme *Oontelus reticulatus* Sol. Chili.

Dysmorphocerus pallidithorax n. sp. Un peu allongé avec les élytres rétrécis en avant et en arrière, un peu brillant, pubescent de gris, noir avec le prothorax testacé pâle, antennes rousses avec les 5 derniers articles foncés, les 2 premiers rembrunis sur le dessus. Antennes grêles sur les 5 derniers articles, épaisses à la base, 2e court, 3-5 presque soudés, 6e difforme, creusé, fortement dilaté-élargi en avant, sinué sur l'arête supérieure ; prothorax transversal, subarqué sur les côtés ; élytres assez longs, un

(1) Aussi du territoire des Misiones au Musée de La Plata.

peu moins larges que le prothorax à la base, nettement élargis sur le milieu, rétrécis ensuite, déhiscents en arrière, séparément arrondis au sommet. Long. 8 mill. Chili (Germain).

Diflére de *dilaticornis* Guer., en plus du 6e article des antennes un peu différent, par le prothorax entièrement clair, la forme des élytres, etc.

Callirrhipis glaber n. sp. Allongé, courtement rétréci aux deux extrémités, très brillant, paraissant glabre, noir de poix, vaguement roussâtre par places avec l'écusson et partie des pattes roux. Tête fortement ponctuée avec quelques rides, impressionnée au-dessus des antennes ; antennes robustes, foncées avec la base marquée de roux, fortement dentées à partir du 3e article ; prothorax subsinué latéralement, subarqué en avant, à ponctuation forte et écartée, marquée d'une profonde fossette de chaque côté du disque et d'une large dépression près des angles postérieurs (fossettes parfois oblitérées avec le prothorax plus régulièrement arqué en avant : var. *subimpressa*) cet organe n'embrassant pas les élytres ; écusson grand, presque lisse ; élytres longs, subsinués latéralement, subarrondis au sommet, à ponctuation médiocre, en partie irrégulièrement disposée et écartée, marqués d'une impression humérale nette, sans côtes distinctes. Long. 13-15 mill. Java (Rouyer).

A placer près de *scutellata* Frm., en diffère par l'écusson non densément pubescent, les élytres dépourvus de côtes distinctes, etc.

Schizotus rotundicollis n. sp. ♀. Allongé, subparallèle, presque mat sur le dessus et pubescent, d'un rouge pourpré sur la tête, celle-ci ayant une macule frontale noire, le prothorax, l'écusson et la première moitié des élytres, noir sur le reste et les membres. Tête carrée derrière les yeux ; dernier article des palpes court, subovalaire ; antennes robustes et longuement dentées, ou pectinées, à partir du 5e article ; prothorax subglobuleux, impressionné

sur le disque; élytres bien plus larges que le prothorax, étroits et longs, munis de côtes nettes. Long. 14 mill. Sumatra.

Voisin de *Theresæ* Pic, en diffère, à première vue, par le prothorax subglobuleux, la tête carrée derrière les yeux et maculée de noir.

Ischalia apicalis n. sp. Un peu brillant sur l'avant-corps et les membres qui sont d'un noir de poix, mat sur les élytres qui présentent la suture, le bord externe et deux côtes latérales, dont l'interne très courte et antérieure et l'externe complète, brillantes, ces organes jaunes avec une macule apicale noire peu large, remontant triangulairement sur la suture presque jusqu'au milieu. Long. 6 mill. Sumatra (Modigliani in coll. Pic).

Voisin de *basalis* Wat, avec la coloration noire moins étendue sur les élytres.

Formicomus Sauteri n. sp. (1) Oblong et assez robuste, brillant, orné de longs poils clairs espacés et en partie redressés, roux plus ou moins clair avec l'abdomen, le sommet des antennes et les pattes en partie rembrunis, les élytres étant plus ou moins roux en avant et plus ou moins largement rembrunis, ou foncés, postérieurement. Tête un peu rétrécie derrière les yeux et subarquée; prothorax peu long, fortement élargi en avant, à ponctuation forte et plus ou moins écartée; élytres assez larges, un peu élargis en dessous du milieu, subarrondis ensemble au sommet, déprimés à la base, à ponctuation peu forte, espacée; pattes robustes, cuisses antérieures ♂ munies d'une dent courte et large, tronquée au sommet, tibias antérieurs un peu dilatés avant le sommet. Long. 5 mill. Formose : Takao (Sauter).

Voisin de *semirufus* Pic, élytres non fortement rétrécis au

(1) Les deux *Formicomus* de Formose, dont je dois la connaissance et la possession à M. Krekich-Strassoldo, figurent aussi dans les collections du Hofmuseum de Wien.

sommet, à coloration moins foncée et moins nettement marquée postérieurement.

Formicomus longispinus n. sp. Oblong, brillant, orné de poils clairs espacés et en partie redressés, noir de poix à reflets métalliques avec le prothorax plus ou moins, à la base tout au moins, roussâtre, base des antennes et des cuisses testacée. Tête un peu rétrécie derrière les yeux et subarquée ; prothorax peu plus long que large, fortement élargi en avant, à ponctuation espacée en avant, dense sur la base ; élytres assez larges, un peu élargis en dessous du milieu, subarrondis ensemble au sommet, parsemés de gros points espacés ; pattes peu robustes, cuisses antérieures ♂ munies d'une épine longue et fine, tibias antérieurs droits. Long. 2,6-3 mill. Formose : Takao (Sauter).

Par la longue épine des cuisses se rapproche de *praeses* Laf. dont il se distingue par les antennes foncées à l'extrémité, la ponctuation forte des élytres, etc.

Je sépare, provisoirement, à titre de variété de cette espèce sous le nom de **formosanus**, une ♀ de forme un peu plus étroite, avec la coloration plus claire, presque entièrement testacée, du prothorax.

Zonabris (Coryna) postbioculata n. sp. Peu allongé, faiblement élargi postérieurement, à peine brillant, orné d'une pubescence grise argentée, noir avec les 4 derniers articles des antennes testacés, les élytres jaunes avec une petite macule humérale noire, le pourtour de l'écusson foncé et une macule apicale noire où est incluse une grande macule jaune subtransversale. Long. 14 mill. Afrique continentale : N. Gami.

Très distinct par sa coloration se rapprochant de celle de *latelutea* Pic, mais avec une macule humérale noire et une macule jaune subapicale.

Catapiestus minutus n. sp. Subparallèle, peu brillant, noir avec une partie du dessous du corps brunâtre ;

prothorax transversal, faiblement arrondi et modérement crénelé sur les cotés, à ponctuation pupilleuse assez forte, un peu espacée sur le milieu, marqué d'un étroit et peu profond sillon médian et, de chaque coté, d'une impression médiane courte et peu profonde. Elytres un peu plus larges que le prothorax, assez fortement ponctué-crénelés ; antennes peu élargies sur les derniers articles ; cuisses antérieures indistinctement dentées vers leur milieu, tibias courts et assez arqués. Long. 13 mill. Ceylan.

Voisin de *indicus* Frm. (ex description) et paraissant en différer par le prothorax plus transversal, autrement ponctué et les cuisses antérieures non munies d'une dent saillante.

Nemostira semirufescens n. sp. Allongé, étroit, faiblement rétréci postérieurement, noir de poix avec les élytres roussâtres, ceux-ci ornés de longs poils clairs espacés avec le devant de la tête, les antennes, celles-ci avec le premier article rembruni, (dernier article des antennes un peu plus long que les deux précédents), la base des cuisses, les tibias et tarses testacés. Yeux grands, se touchant sur le front ; prothorax plus long que large, à angles postérieurs saillants, finement et plus ou moins éparsement ponctué ; élytres plus larges que le prothorax, longs, rétrécis et subacuminés au sommet, striés, les stries ponctuées de points forts, intervalles irrégulièrement ponctués. Long. 11 mill. Madagascar.

Paraît voisin de *fuscipennis* Frm. et en diffère au moins par la coloration du dessus du corps et les pattes presque entièrement testacées.

Nemostira cinctipennis n. sp. Allongé, étroit, faiblement rétréci postérieurement, noir avec la base des cuisses et partie des tibias, ainsi que le milieu du disque des élytres, testacés, ces derniers organes étroitement bordés de foncé et ornés de longs poils clairs espacés. Yeux écartés ; dernier article des antennes très grand, au moins aussi long

que les six précédents; prothorax plus long que large, finement et éparsement ponctué ; élytres longs, rétrécis et subacuminés au sommet, fortement strié-ponctués. Long. 9 mill. Madagascar : Annanarivo (Sikora).

Très voisin de l'espèce précédente par sa forme, mais yeux plus petits et écartés, coloration toute autre, etc.

Nemostira obscura n. sp. Noir, brillant, hérissé de longs poils clairs avec les élytres assez larges, parallèles, à stries ponctuées de très gros points, peu réguliers ; prothorax peu plus long que large ayant seulement quelques gros points épars ; antennes robustes, à dernier article à peu près de la longueur des deux précédents. Long. 6,5-7 mill. Java : Soekaboemi (H. Fruhstorfer).

Très voisin de *sulcaticeps* Pic par sa forme et ponctuation, mais coloration différente, prothorax à points moins nombreux, etc.

Nemostira caeruleipennis n. sp. Un peu allongé, atténué postérieurement, brillant, éparsément hérissé de longs poils clairs, noir avec les élytres bleus à reflets métalliques, parties de la bouche et tarses testacés, antennes en partie rembrunies à la base, celles-ci grêles, à dernier article assez long, un peu plus long que les deux précédents réunis. Prothorax presque carré, finement réticulé avec quelques points assez gros, épars ; élytres assez longs, rétrécis et acuminés au sommet, strié-ponctués avec les intervalles très finement réticulés. Long. 7 mill. N. Célèbes : Toli-Toli (H. Fruhstorfer).

Cette espèce, très distincte par sa coloration, peut, à cause de sa forme voisine, prendre place près de *atriceps* Frm.

Nemostira nitidissima n. sp. Très voisin du précédent par son aspect brillant, mais forme un peu plus robuste, ponctuation du prothorax plus marquée, antennes plus longues avec le dernier article plus grand et coloration très

différente, testacée avec l'abdomen noir et les élytres d'un vert métallique. Long. 8 mill. Célèbes : Toli-Toli.

Espèce très distincte entre toutes par sa coloration mimant celle de divers *Brachynus* Chd.

Nemostira maxima n. sp. Grand, robuste sur l'arrière-corps, peu brillant et densément ponctué sur le prothorax, brillant sur les élytres qui sont striés avec les intervalles irrégulièrement ponctués, noir avec les élytres verdâtres, vaguement roussâtres à leur extrémité, ornés d'une pubescence claire, longue, espacée, dessous du corps noir de poix, très brillant, pattes et antennes noires, ces dernières assez grêles, à dernier article peu plus long que le précédent. Tête sillonnée sur le vertex, fortement ponctuée, yeux écartés; prothorax peu plus long que large, bien plus étroit que les élytres. Long. 15 mill. Célèbes : Bua-Kraeng (H. Fruhstorfer).

Diffère de *impressifrons* Schauf, (décrit comme Lagria mais qui paraît être un Nemostira) au moins par la coloration des élytres.

Lasiophrys longicornis n. sp. Peu allongé, subparallèle, très brillant, pubescent de flave avec quelques longs poils clairs dressés, testacé avec le sommet des mandibules, les yeux, les antennes et environ le quart apical des élytres noirs. Tête large, à ponctuation forte et espacée; antennes poilues, presque deux fois aussi longues que le corps ; prothorax court, plus étroit que la tête, un peu étranglé vers la base, à ponctuation forte et écartée ; élytres plus larges que le prothorax, courts, à ponctuation forte et écartée, effacée postérieurement, à bord sutural nettement relevé ; pattes robustes, tibias antérieurs un peu arqués, Long. 10 mill. Cochinchine.

Très distinct de *latifrons* Gahan, en outre de la coloration, par la forme moins large et les antennes bien plus longues que le corps.

Plaxomicrus violaceomaculatus n. sp. Oblong, élargi postérieurement, brillant, à pubescence claire espacée, testacé avec les yeux et le dessous du corps en majeure partie noirs, pour le reste testacé, à l'exception des élytres qui ont une fascie basale courte, à contours postérieurs irréguliers, d'un violet métallique, celle-ci entourant l'écusson. Tête plus large que le prothorax, celui-ci court, nettement gibbeux sur les côtés et étranglé sur la base, à gibbosité discale peu marquée ; élytres plus larges que le prothorax et éparsément ponctués. Long. 11 mill. ? Assam.

Voisin de *Oberthuri* Gahan et en différant au moins par la coloration testacée des pattes et la fascie violette des élytres particulière.

Antonaria albonotata n. sp. Peu allongé, très rétréci postérieurement, fortement et densément ponctué, noir, brillant avec le dessous du corps assez densément, l'avant-corps sur les côtés (en outre une ligne médiane longitudinale blanche) et l'écusson pubescents de blanc, élytres ornés près de la suture de plusieurs macules de pubescence blanche et sommet également pubescent de blanc ; antennes et pattes, sauf les fémurs rouges, noires. Long. 9 mill. Sierra Leone.

Cette espèce, très distincte par ses macules blanches aux élytres, peut se placer près de *modesta* Jac.

Sphondilia testacea n. sp. Allongé, rétréci postérieurement entièrement testacé, pubescent de flave, mais sans macules pubescentes marquées ; avant-corps peu brillant, densément ponctué ; élytres très brillants, médiocrement ponctués. Long 10 mill. Congo Portugais.

Ressemble à *tomentosa* Lac., mais élytres sans fascie pubescente et avant-corps concolor.

ÉTUDE DICHOTOMIQUE DU GENRE DRILOSILIS PIC

J'ai établi le genre Drilosilis (l'*Echange*, n° 324, 1911, p. 188) pour une espèce de Mentawei et décrit depuis (Deuts. Ent. Nat. Bibliothek II, 1911, p, 188) une deuxième espèce de Formose.

Comme son nom l'indique, ce genre tient à la fois des *Drilus* Ol. et des *Silis* Latr. il offre comme caractères distinctifs faciles à voir : des antennes robustes et plus ou moins fortement dentées, un prothorax dilaté latéralement (dans le genre des Plectonotum Gorh.) en une forte saillie ou callosité brillante, puis légèrement échancré en dessous près de la base avec les angles postérieurs plus ou moins marqués.

Je classe dans le genre *Drilosilis* plusieurs espèces nouvelles, toutes de ma collection, qui se distingueront entre elles, ainsi que des deux espèces décrites, plus facilement à l'aide du synopsis suivant que par des descriptions séparées. D. rubrithorax Pic excepté, ces espèces ont les antennes entièrement foncées et toutes ont les pattes foncées.

1 Elytres entièrement, ou au moins en partie, testacés ou rougeâtres. 4

1' Elytres entièrement noirs. 2

2 Prothorax foncé, ainsi que tout le corps ; antennes entièrement noires. 3

2' Prothorax testacé-rougeâtre ; antennes roussâtres à l'extrême base. Long. 7 mill. Formose.

rubrithorax Pic.

3 Assez robuste et peu brillant ; élytres très rétrécis en arrière. Long. 7 mill. Mentawei.

mentaweiensis Pic.

3' Allongé, subparallèle et très brillant. Long. 5 mill. Bornéo. **parallelus** n. sp.

4 Elytres foncés à l'extrémité. 8

4' Elytres entièrement testacés, ou d'un jaune ocré, parfois avec les épaules, ou un mince rebord antérieur externe, foncés. 5

5 Prothorax entièrement foncé ainsi que l'abdomen ; coloration élytrale moins pâle et ces organes d'ordinaire très pubescents. 6

5' Prothorax testacé, à bande médiane noire et callosités latérales foncées ; abdomen en partie testacé ; élytres d'un jaune pâle, peu pubescents, à côtes nettes. Long. 7 mill. Java. **costatus** n. sp.

6 Elytres à épaules tachées de foncé. 7

6' Elytres concolores, entièrement d'un testacé ocré, très densément pubescents. Long. 8 mill. Java.

Armitagei n. sp.

7 Elytres très longs, presque mats, à bordure basale foncée ; calus latéraux du prothorax plus saillants et moins larges. Long. 7 mill. Sumatra, **Rouyeri** n. sp.

7' Elytres relativement courts et très brillants, à bordure basale foncée et ornés, en plus, d'une bordure latérale partant de la base et dépassant le milieu de ces organes ; calus latéraux du prothorax moins saillants et plus larges. Long. 6 mill. Sumatra. **nitidior** n. sp.

8 Elytres très allongés, rouges à grande macule apicale noire, rebords latéraux et parfois suture étroitement noirs. 9

8' Elytres peu allongés, jaunes à macule apicale noire remontant triangulairement sur la suture ; pas de bordure latérale noire. Long. 6 mill. Bornéo.

borneensis n. sp.

9 Prothorax noir, à callosités latérales très marquées; élytres à côtes faibles. Long. 19 mill. Bornéo.

Fruhstorferi n. sp.

9' Prothorax testacé-roussâtre, à ligne longitudinale noire étroite et callosités latérales faibles; élytres marqués de côtes très distinctes. Long. 19 mill. Java.

ruficollis n. sp.

NOTES SUR QUELQUES INSECTES NOUVEAUX OU PEU CONNUS, MUTATIONS ET SYNONYMIES

Discodon Schneideri Pic doit être rapporté à *D. oppositipunctum* Gorh., comme variété, se distinguant de la forme type par la tête maculée de foncé. Le ♂ a le prothorax plus long que ♀ et nettement sinué-échancré latéralement.

Discodon flaccidum Gorham. Sous ce nom, j'ai trouvé deux espèces dans la collection Gorham, l'une, originaire de Teleman et Cubilgnitz, est l'espèce décrite par Gorham, l'autre nouvelle, provenant du volcan de Chiriqui (localité non mentionnée dans le Biologia) offre une coloration analogue c'est-à-dire foncée avec le devant de la tête, le pourtour du prothorax étroitement, une bordure élytrale et les pattes en majeure partie testacés, mais l'aspect est

mat, le prothorax plus transversal, les élytres un peu moins allongés, les antennes sont déprimées et aplaties sur leur milieu, au lieu d'être subfiliformes. Je donne à cette nouvelle espèce le nom de **chiriquense**.

Discodon cinereum Gorham. Sous ce nom, la collection Gorham comprend évidemment deux espèces, l'une, originaire de Calderas, de forme moins allongée et caractérisée surtout par son prothorax qui est presque carré, très inégal sur le disque, gibbeux et impressionné sur le milieu, avec chez ♂ une dent latérale très marquée et la tête très enchassée dans le prothorax, (tandis que la coloration testacée est limitée, sur cet organe, aux côtés postérieurs) avec les angles postérieurs peu saillants et le bord antérieur presque droit, ou à peine arqué. Cette espèce doit être regardée comme la forme type. L'autre (dont je possède un seul ♂ originaire du Volcan de Chiriqui) est une nouvelle espèce que je nomme **podabroides**, celle-ci bien distincte de la première, en outre de sa forme plus allongée, par sa tête grosse, détachée du prothorax, ce dernier organe étant largement sillonné sur le disque, presque lisse, dépourvu de dent saillante sur les côtés (qui en outre sont, à l'exception du milieu, bordés étroitement de flave), nettement arqué en avant avec les angles postérieurs saillants en dehors.

Catapiestus simillimus Fairm. Cette espèce, décrite de Sumatra, se retrouve à Bornéo (coll. Pic), elle est très distincte par la sculpture de son prothorax dont tout le milieu est lisse, avec un étroit sillon médian, au lieu d'être plus ou moins ponctué.

Cryptocephalus sexsignatus F. Cette espèce, des Indes et de Ceylan, varie quant à ses dessins élytraux ; la forme type a, sur chaque élytre, une macule humérale noire et deux autres postmédianes disposées transversalement. Une

très jolie variété, que j'appelle **postlatefasciatus** (1), offre une macule humérale et une large fascie transversale anteapicale noires.

Malachius spinipennis Horn (1874), de l'Am. S^le^, est préoccupé par *spinipennis* Germ. (1824) et devra être muté en **Horni**.

Dasytes Bourgeoisi Lea (1909), de Tasmanie, est préoccupé par *Bourgeoisi* Schilsky (Kuster XL, 1903) et devra être muté en **tasmanicus**.

Dasytes Helmsi Black (1892), d'Australie, est préoccupé par *Helmsi* Sharp. (1882) et devra prendre le nom de **Elderi**.

Dasytes ruficollis Lec. (1876) de l'Am. S^le^ ; est préoccupé par *ruficollis* Phil. (1864) et devra prendre le nom de **rufithorax**.

Cryptocephalus sanguinolentus Ol. (1808), des Indes, est préoccupé par *C. sanguinolentus* Scop. (1763) et devra prendre le nom de **Syrdari**.

Le genre *Eutheca* Kiesw. (1877) est à réunir au genre *Eupactus* Lec. (1861 et 1865) qui lui-même a, d'après Fall, pour synonyme *Thaptor* Gorh. (1883).

Le genre *Xylotheca* Reitt. (1897) ne me paraît pas devoir être distingué génériquement du genre *Cathorama* Guer. (1850).

D'après Germain, (Actas du Chili 2, 1892, p. 254) le genre *Ocelliger* Phil. doit être supprimé et mis en synonymie du s. g. *Eurhopalus* Sol. Cette indication bibliographique manque dans les *Dermestidae* (part. 33 du Coleopterorum Catalogus) rédigés par Dalla Torre, ainsi d'ailleurs que le nom générique de *Ocelliger* Phil.

(1) C'est la figure 90 page 241 de la Fauna of Britsh India II, de Jacoby.

SAINT-AMAND, CHER. — IMPRIMERIE BUSSIÈRE.

TITRES DES ARTICLES
CONTENUS DANS LE DEUXIÈME FASCICULE

	Pages
AVANT-PROPOS	1
Descriptions d'espèces et variétés appartenant à diverses familles	2
Etude dichotomique du genre Drilosilis Pic.	12
Notes sur quelques insectes nouveaux ou peu connus, mutations et synonymies	14